



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

## REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n°02 du 09 Février 2000 - 1 page

### COLZA : stade C2 Charançons de la tige

Le vol a débuté timidement le samedi 5 Février et a été aussitôt interrompu par les mauvaises conditions climatiques actuelles. Le temps va rester défavorable le reste de la semaine.

Cinq captures seulement ont été enregistrées à ce jour ; 2 dans la plaine de Thouars, 1 en Centre Charente et 2 près de Poitiers.

*Il est trop tôt pour faire des pronostics quant à la date d'intervention. Celle-ci sera précisée si nécessaire dans le prochain bulletin, en fonction de l'évolution du vol.*

### BLE : stade début à mi-tallage Piétin-verse (Modèle TOP)

Depuis deux semaines les conditions climatiques sont à nouveau **favorables** aux contaminations (passages pluvieux, températures supérieures de 2° C aux Normales).

Une contamination **primaire supplémentaire** et la **première contamination secondaire** sont intervenues. Le **risque climatique** a donc progressé ; il se situe à un niveau légèrement inférieur à celui observé en 98 et 99 à la même date pour des semis d'Octobre.

Le tableau ci-dessous vous aidera à évaluer le **risque parcellaire** pour 2000 ; il a été actualisé en tenant compte de la forte présence de la maladie dans de nombreuses situations en 98 et surtout en 99.

DATE DE SEMIS		TYPE DE SOL		PRECEDENTS	
Avant le 28/10	7	Limon	5	Blé en 99	5
Du 28/10 au 29/11	+ 4	Groies séchantes	1	Blé en 98	3
				Blé en 97	1
A partir du 30/11	1	Sol de marais Autres types de sol	0 3	Blé en 99 et 98	6
				Blé en 99 et 97	5
				Blé 98 et 97	4
NOTE 1		NOTE 2		NOTE 3	

Note globale = Note 1 + Note 2 + Note 3  
Note supérieure ou égale à 13 = risque élevé

Note de 10 à 12 = risque moyen  
Note inférieure à 10 = risque faible

- Note supérieure ou égale à 13 = prévoir un traitement anti-piétin
- Note de 10 à 12 = établir une stratégie de lutte globale (piétin/feuilles)
- Note inférieure à 10 = les maladies foliaires seront à considérer en priorité.

La climatologie des prochaines semaines pourrait conduire à modifier ces premières indications.

Par ailleurs, il convient de préciser que d'autres éléments peuvent contribuer à évaluer le risque parcellaire (kit, analyses...).

**Remarque :** Comme indiqué dans le bulletin du 30/09/99, les matières actives à retenir pour intervenir contre cette maladie sont le **prochloraze** ou le **cyprodinil**.

Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
13 route de la Forêt  
86580 BIARD  
☎ : 05.49.62.98.25  
Fax : 05.49.62.98.26

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles de POITOU-  
CHARENTES

Le Directeur-Gérant :  
L. JUILLARD CONDAT

Publication périodique  
C.P.A.P. n° 2139 AD  
ISSN n°02294 470

### BLE

**Piétin-verse :**  
Le point sur l'évaluation du risque

### COLZA

**Charançon de la tige :**  
Captures très rares



P122